Pénéplanation et dynamique profonde des Pyrénées

Gemma V. Bosch

Thèse soutenue à Rennes le 09/12/2016

Devant un jury composé de :

Jean VAN DEN DRIESSCHE (directeur)

Julien BABAULT (encadrant)

Alexandra ROBERT (encadrante)

Antonio CASAS SAINZ (rapporteur)

Marianne FONT (rapporteur)

Gweltaz MAHÉO (examinateur)

Yves LAGABRIELLE (examinateur)

Robert WYNS (examinateur)

Surfaces à faible relief et à haute altitude

**Recoupent les structures tectoniques pyrénéennes:
"surfaces post-tectoniques"**

Age?

Upper age-limit: 11 Ma

De Sitter, 1953

Lower age-limit: around 30 Ma

Thermochronology (AFT and AHe)

Gunnell et al., 2009

Gibson et al. 2007

Babault et al. 2009, modified from Gibson et al. (2007)

Origine?

Interprétation classique ("le cycle géographique" (Davis, 1899))

1. **Aplanissement:** érosion à long terme et formation de la pénéplaine

La diminution progressive de l'altitude entraîne celle du potentiel érosif des rivières
Les vallées s'élargissent entraînant le lissage du relief
La source des rivières tend vers leur niveau de base

2. **Soulèvement post-tectonique:**

réjuvénation du relief, dissection de la pénéplaine

***Les surfaces HE-LR sont les reliques d'une ancienne pénéplaine
Leur altitude correspond à la quantité de soulèvement post-tectonique***

Interprétation classique à l'échelle lithosphérique

1. **Aplanissement:** érosion à long terme et formation de la pénéplaine

La diminution de l'altitude s'accompagne de
l'élimination de la racine crustale en profondeur

La seule présence d'un épaissement crustal invalide l'interprétation classique
(à moins d'envisager une densité crustale anormalement élevée
Proche de celle du manteau lithosphérique)

Interprétation classique à l'échelle lithosphérique

1. Soulèvement post-tectonique:

réjuvénation du relief, dissection de la pénéplaine

La seule façon d'entraîner un soulèvement de la pénéplaine *sans la déformer* est d'amincir le manteau lithosphérique

Tout épaissement crustal nécessiterait un raccourcissement conséquent et une déformation de la surface de pénéplanation au même titre que celle de couches de sédiments

L'interprétation classique dans le cas des Pyrénées

**Une montagne en voie d'aplanissement :
au début du Néogène il n'y avait plus de Pyrénées...**

Marc Calvet, Toulouse 2011

Les plas du Campcardos et au fond le Carlit

À l'ouest aussi...

Au centre: des plans sur les marges plissées; une haute chaîne jamais arasée?

À l'est des aplanissements généralisés, des Prépyrénées à la Haute chaîne axiale

Interpretation alternative:

le développement en altitude de la pénéplaine pyrénéenne (Babault et al. 2005)

Interprétation alternative:
le développement en altitude de la pénéplaine
pyrénéenne (Babault et al. 2005)

Interprétation alternative:

Le développement en altitude de la pénéplaine pyrénéenne (Babault et al. 2005)

La remontée du niveau de base efficace des rivières
(conditions aux limites de la chaîne et climat)

L'aggradation des sédiments détritiques au pied de la chaîne traduit:
la diminution de la capacité des rivières à exporter les sédiments
la diminution progressive de leur potentiel érosif
la remontée de leur niveau de base des rivières

Le niveau de base des rivières tend vers l'altitude de leur source!

***Les surfaces HE-LR sont les reliques d'une ancienne pénéplaine
qui s'est développée en altitude***

La racine crustale est préservée

Surfaces à haute altitude et faible relief : reliques d'une pénéplaine pyrénéenne miocène

- **Modèle 1 : soulèvement post-miocène**
 - Erosion de la racine crustale
 - changement de densité en profondeur post-miocène
 - "érosion" du manteau lithosphérique

- **Modèle 2 : haute altitude acquise dès le miocène**
 - Conservation de la racine crustale

- **Modèle 1 appliqué aux Pyrénées orientales :**
 - L'altitude des surfaces est contrôlée par la limite lithosphère/asthénosphère et indépendante de la topographie du Moho*

- **Modèle 2 appliqué aux Pyrénées centrales et orientales :**
 - L'altitude des surfaces est contrôlée par la topographie du Moho*

Existe-il une dualité entre Pyrénées orientales et le reste des Pyrénées ?

Quelle est l'extension de ces surfaces à l'échelle des Pyrénées ?

Les objectifs

- ✓ Cartographie des reliques de la surface de pénéplanation pyrénéenne à l'échelle des Pyrénées centrales et orientales
- ✓ Restauration de la surface de pénéplanation à l'échelle des Pyrénées
- ✓ Superposition en 3D et degré de corrélation entre surface de pénéplanation, Moho et interface lithosphère/asthénosphère

Méthodologie

Compilation

bibliographique des
cartes

géomorphologiques des
Pyrénées → **Terrain +**
observations Google

Earth →

Détermination des
paramètres numériques
qui **différencient** les
reliques de pénéplaine du
reste des formes du relief

→ **Extension de**
la
cartographie
locale à
l'échelle de la
chaîne →

Validation
terrain

Caractéristiques numériques des reliques

Comment cartographier automatiquement des surfaces reliques à très **faible pente** situées à **haute altitude**?

Application de deux filtres calculés à partir du MNT: **la pente et l'altitude**

On ne peut pas différencier le fond des cirques glaciaires et des hautes vallées

des reliques de la pénéplaine pyrénéenne

Image © 2015 Institut Cartogràfic de Catalunya

Image © 2015 DigitalGlobe

Google earth

2004

Imagery Date: 1/1/2012 42°29'19.57" N 1°47'57.12" E elev 8493 ft eye alt 29348 ft

Caractéristiques numériques des reliques

Topographic Position Index (e.g. Weiss, 2001)

+

Déviaton par rapport à l'altitude moyenne (*dev*)
(Galland et Wilson, 2000; De Reu et al.2013)

$$dev = TPI (R) / Std (R)$$

-

Permet de différencier les **reliques de la pénéplaine pyrénéenne**, du **fond des cirques glaciaires** et du **fond des hautes vallées**

A

B

$h - h_{mean} = + \rightarrow$ RIDGE

$h - h_{mean} = - \rightarrow$ VALLEY

Caractéristiques numériques des reliques

Deviation from mean elevation (*dev*)

DEV
R = 300m

DEV
R = 3000m

Caractéristiques numériques des reliques

Deviation from mean elevation (*dev*)

DEV
R = 300m

DEV
R = 3000m

Reliques pénéplaine Pyrénéenne

Caractéristiques numériques des reliques

Deviation from mean elevation (*dev*)

DEV
R = 300m

DEV
R = 3000m

Reliques pénéplaine Pyrénéenne

Cirques glaciaires

Méthode de cartographie : résultats

Automatic mapped HE - LR surface

Hand mapped HE - LR surfaces

Methodologie de cartographie des reliques de la Resultat pénéplaine

Methodologie de cartographie des reliques de la Validation sur le terrain pénéplaine

**Restauration de la géométrie
de la surface de
pénéplanation dans les
Pyrénées au Miocène moyen
(~ 10 Ma)**

Interpolation of the surfaces remnants

Bosch et al. 2016

Interpolation of the surface remnants

The highly elevated Pyrenean peneplain

Interpolation of the HE-LR surfaces

ECORS Profile

Eastern Pyrenees profile

Est - west profile

Bosch et al. 2016

The difference in elevation (~ 450m) between the restored peneplain surface and the mean elevation corresponds to the amount of erosion due to Plio-Quaternary dissection

Méthodologie

PRESENT-DAY TOPOGRAPHY

Méthodologie

PRESENT-DAY TOPOGRAPHY

THERMOCHRONOLOGICAL CONSTRAINT

Méthodologie

PRESENT-DAY TOPOGRAPHY

THERMOCHRONOLOGICAL CONSTRAINT

ISOSTATIC CONSTRAINT

Méthodologie

PRESENT-DAY TOPOGRAPHY

THERMOCHRONOLOGICAL CONSTRAINT

ISOSTATIC CONSTRAINT

FAULT CONSTRAINT

Restauration de la géométrie de la péninsule

Altitude des reliques et structure profonde

Modèle 1D des épaisseurs crustale et lithosphérique

Inputs

(Fullea et al., 2007)

Outputs

- Hypothèse isostatique locale
- Équilibre thermique

- Z croute
- Z lithosphère

Topographie

Géoid

4 layers model

Validation hypothèses

Z croute données sism

Compensation at 400km

Chevrot et al., (2014)

Épaisseurs crustale et lithosphérique des Pyrénées

Épaisseur crustale des Pyrénées

Vertical exaggeration x4

Bosch et al., 20

Reliques vs. structure profonde des Pyrénées

ECORS profile

West-East profile

CONCLUSIONS

- L'altitude de ces surfaces est compensée isostatiquement par une croûte épaisse de 40 à 50 km de densité normale.
- Elles correspondent à des reliques d'une seule et même surface de pénéplanation en haute altitude qui se développe jusqu'au Miocène moyen

CONCLUSIONS

- Les surfaces d'érosion à faible relief et haute altitude sont présentes partout dans la chaîne
- Les mouvements verticaux dans les Pyrénées post-Miocène se limitent
 - (1) à la diminution de l'altitude moyenne de la chaîne en réponse à l'érosion et
 - (2) au rebond isostatique des surfaces reliques (surface de "non-érosion") de 400 m

Merci

Influence of the piedmont sedimentation: experimental approach

(Babault, 2004, Babault et al. 2005, 2006)

Rainfall simulator

Laboratorio de Rennes

Tipo de experimento 1

Tipo de experimento 2:
Tipo 1 + sedimentación de piedemonte

A

Reliques de pénéplaine à haute altitude : deux hypothèses

Pénéplanation au niveau de la mer et soulèvement par amincissement du manteau lithosphérique

L'aplanissement en altitude par la remontée du niveau de base

Erosion → Sédimentation de piémont → Racine crustale préservée → Altitude préservée

Surfaces vs. deep structure of the Pyrenees

ECORS Profile

Eastern Pyrenees profile

Enfouissement oligo-miocène des versants

AHe + AFT sur le versant sud

Enfouissement oligo-miocène des versants

AFT sur le versant nord

Enfouissement oligo-miocène des versants

Échantillonnage pour AHe sur le versant nord

Enfouissement oligo-miocène des versants

Échantillonnage pour AHe sur le versant nord

Increased sedimentation rates and grain sizes 2–4 Myr ago due to the influence of climate change on erosion rates

Zhang Peizhen*, Peter Molnar†‡ & William R. Downs§

*Institute of Geology, State Seismology Bureau, Beijing, China

†‡ Department of Earth, Atmospheric, and Planetary Sciences, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, Massachusetts 02139, USA

§Bilby Research Center, Northern Arizona University, Flagstaff, Arizona 86011-6013, USA

Classical interpretation: “uplifted peneplain” (Davis 1899)

Peneplanation of a relief (mountain belt) near sea level

uplift relief rejuvenation

Peneplanation = **crustal root erased**
("normal" crustal thickness)

Uplifted peneplain = **mantle dynamics**

Methodologie de cartographie des reliques de la péninsule ibérique

Definir les caracteristiques géographiques : l'elevation (hipsometrie)

Hipsometrie des HE - LR surfaces

Hipsometrie des Pyrénées

Hipsometrie des HE - LR surfaces normalisée

Fig. 5. A. Simplified geological map of the Aston area, derived from the 1/50,000 geological map (Destombes et al., 1969), and location of the surfaces (colour gradient from light grey for low elevations to black for high ones). PB: Plateau de Beille; PF: Pla du Four; PBr: Pla de Bourbourou; PdM: Pla du Mont; PT: Pla de Tabé; PM: Pla de Madame. A–B: Location of the cross-section. B. NW–SE cross-section from Pla du Four to Ax-Bonascre. The thalwegs are made by planar surfaces used to define the envelope surface. This surface is interrupted by incised valleys like the Aston one. The surface deflection between Pla de Bourbourou and Ax-Bonascre is concomitant with a step. C. North–south cross-section from the Plateau de Beille to the Saint-Barthélémy summit, showing the stepped surfaces and preserved alterites controlled by normal faults (not mapped in Fig. 5A) on both sides of the Ariège River (see the text for further explanations).

Fig. 4. NE-SW geological cross-section across the Bordères-Louron granite, showing the elevations of the different surface levels, such as the main one at 1100 m asl. See location in Fig. 2.

Model 1

Model 2

Fig. 9. Cartoon summarizing two alternative scenarios of topographic evolution in the Pyrenees prior to the uplift and valley incision caused by thermal erosion of the lithospheric root ca. 12 Ma. Topography in grey. Note that in scenario B the few occurrences of planar topography known in the Central Pyrenees cannot be unequivocally labelled as P or S.

Pénéplanation et dynamique profonde d

Gemma V. Bosch

Méthodologie de cartographie des reliques de la pénéplaine

Méthodes de cartographie semi-automatique

e.g. Brown et al., 1998; Prima et al., 2006

Basées sur 3 conditions principales (*Brown et al., 1998, d'après Pike, 1988*):

- A **processus d'érosion distincts** doivent correspondre des **formes topographiques distinctes**
- Les **descripteurs quantitatifs de la topographie** doivent pouvoir identifier les **caractéristiques spécifiques** de chaque forme du relief
- Le **degré de définition** des unités topographiques doit être suffisant pour **mesurer ces différentes formes**
 - **ont une signification génétique**
 - **permettent d'adapter la cartographie à un objectif scientifique déterminé**